



PACIENTE: _____

USO ORAL

1- Pantoprazol 40 mg ----- QSP.

Tomar 01 comp. de 12/12h em jejum por 14 dias e em seguida 01 comp. cedo em jejum até completar 02 meses.

*OBS: preferencialmente tomar 01comp. pela manhã em jejum 7 dias antes do procedimento.

2- Sucrafilm 1g (flaconete ou mastigável) ----- 01 caixa.

Tomar uma unidade de 12 em 12h por 03 dias e após se azia ou queimação (refluxo).

3- Vonau Flash® 8 mg ----- QSP.

Tomar 01comp. de 08 em 08 horas por 05 dias ou até o fim dos sintomas.

4- Dramin B6® ----- QSP.

Tomar 50 gotas ou 01 comp. de 06 em 06 horas por 05 dias ou até o fim dos sintomas.

5- Lisador® ----- QSP.

OU

Buscopan composto ou Duo/plus ou Tropinal ----- QSP.

Tomar 50 gotas ou 01 comp. de 06 em 06 horas por 05 dias ou até o fim dos sintomas.

6- Luftal® gotas/cápsula gel ----- 01 Frasco.

Tomar 50 gotas ou 01comp. de 06 em 06 horas por 05 dias.

Local e data: _____

Dr. Marcio Lamas Lopes
CRM – SP 133420
Cel: +55 (11) 98409-6670

Dr. Rodrigo Porphirio Sant'Ana
CRM – SP 114910
Cel: +55 (11) 99952-4430

