



**PACIENTE:** \_\_\_\_\_

**USO ORAL**

**1- Pantoprazol 40 mg** ----- QSP.

Tomar 01 comp. de 12/12h em jejum por 14 dias e em seguida 01 comp. cedo em jejum até completar 02 meses.

**2- Sucrafilm 1g** (flaconete ou mastigável) ----- 01 caixa.

Tomar uma unidade de 12 em 12h por 03 dias e após se azia ou queimação (refluxo).

**3- Dramin B6®** ----- QSP.

Tomar 50 gotas ou 01 comp. de 06 em 06 horas por 03 dias.

**4- Vonau Flash® 8 mg** ----- QSP.

Tomar 01comp. Até de 08 em 08 horas caso náusea não alivie com o Dramin®.

**5- Lisador®** ----- QSP.

**OU**

**Buscopan composto ou Duo/plus ou Tropinal** ----- QSP.

Tomar 50 gotas ou 01 comp. de 06 em 06 horas por 05 dias ou até o fim dos sintomas.

**6- Luftal® gotas/cápsula gel** ----- 01 Frasco.

Tomar 50 gotas ou 01comp. de 06 em 06 horas por 05 dias.

Local e data: \_\_\_\_\_

---

Dr. Marcio Lamas Lopes  
CRM – SP 133420  
Cel: +55 (11) 98409-6670

Dr. Rodrigo Porphirio Sant'Ana  
CRM – SP 114910  
Cel: +55 (11) 99952-4430

