

**PACIENTE:****USO ORAL**

- Pantoprazol 40 mg ----- QSP.

Tomar 01cp pela manhã em jejum enquanto estiver com o balão intragástrico.

- Vonau Flash® 8 mg ----- QSP.

Tomar 01cp de 08 em 08 horas por 05 dias ou até o fim dos sintomas.

- Dramin B6® ----- QSP.

Tomar 50 gotas ou 01 cp de 06 em 06 horas por 05 dias ou até o fim dos sintomas.

- Lisador® ----- QSP.

OU

Buscopan composto ou plus ----- QSP.

Tomar 50 gotas ou 01 cp de 06 em 06 horas por 05 dias ou até o fim dos sintomas.

- Luftal gotas -----01 Frasco.

Tomar 50 gotas de 06 em 06 horas por 05 dias.

- * Sucrafilm 1g (flaconete ou mastigável) ----- 01 caixa.

Tomar uma unidade de 12 em 12h caso apresente azia ou queimação (refluxo).

_____, _____ DE _____ DE 20____.

Dr. Marcio Lamas Lopes
CRM – SP 133420
Cel: +55 (11) 98409-6670

Dr. Rodrigo Porphirio Sant'Ana
CRM – SP 114910
Cel: +55 (11) 99952-4430

